

СССР — Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 12419—66
	ШКУРКИ КОЛОНКА И СОЛОНГОЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ Kolinsky and solongoi skins undressed	Взамен ГОСТ 6372—52 и ГОСТ 6487—53
		Группа С82

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки колонка и солонгоя (горного колонка) из отряда хищных, семейства куньих.

2. Шкурки колонка имеют волосяной покров рыжевато-желтого цвета, а шкурки солонгоя — с более низким волосяным покровом песочно-желтого цвета.

3. Шкурки колонка и солонгоя должны быть сняты чулком с головы, с закрытым огузком или трубкой, с сохранением меха головы (с носиком), лап и хвоста; очищены от прирезей мяса, хрящей и сухожилий, костей из лап и хвоста; очищены от грязи и запекшейся крови с мездры и волоса; оправлены мездрой наружу на правилках установленной формы с отношением ширины шкурки к ее длине 1:8 (для шкурок колонка) и 1:7 (для шкурок солонгоя) и законсервированы пресно-сухим способом; мездра должна быть хорошо обезжирена без повреждения корней волос.

4. В зависимости от качества волосяного покрова и районов распространения колонка шкурки подразделяются по кряжам в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Наименования кряжей	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова и мездры
1. Амурский	Амурская область, кроме Желтулакского, Зейского и Тыгдинского районов; Приморский край; Амурский, Бикинский, Вяземский, Комсомольский, им. Лазо, Наинский, Ульчский, Хабаровский районы Хабаровского края и Еврейская автономная область	Густой, высокий, грубоватый

Внесен Центросоюзом

Утвержден Комитетом стандартов,
 мер и измерительных приборов
 при Совете Министров СССР
 17/XII 1966 г.

Срок введения
 1/VII 1967 г.

Продолжение

Наименования кряжей	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова и мездры
2. Тобольский	Новосибирская, Томская, Тюменская, Омская, Свердловская, Курганская и Челябинская области	Высокий, густой и малшелковистый. Мездра плотная и менее плогная
3. Башкирский	Башкирская АССР; Татарская АССР; Пермская область	Менее густой, мездра плотная
4. Енисейский	Красноярский и Алтайский края; Тувинская АССР; Кемеровская область; Казахская ССР	Высокий, шелковистый. Мездра менее плотная
5. Якутский	Якутская АССР; Бадайбинский, Брагский, Жигаловский, Катапский, Качугский, Казачинский, Ленский, Киренский, Нижне-Илимский, Усть-Кугский, Мамско-Чуйский, Нижнеудинский районы Иркутской области; Каларский, Тунгокоченский, Тунгиро-Олекминский районы Читинской области; Желтулакский и Зейский районы Амурской области; Хабаровский край, кроме районов, указанных в Амурском кряже; Северо-Байкальский и Баунтовский районы Бурятской АССР	Густой, шелковистый. Мездра плотная
6. Забайкальский	Иркутская, Читинская области и Бурятская АССР, кроме районов, указанных в Якутском кряже; Тыгдинский район Амурской области	Густой, малшелковистый. Мездра плогная

Примечание. Шкурки, поступившие из районов, не перечисленных в табл. 1, относятся к тому кряжу, которому они соответствуют по качеству волосяного покрова.

5. По размерам шкурки колонка и солонгоя должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Наименования кражей	Площадь шкурок в см ²		
	Крупный	Средний	Мелкий
Шкурки колонка			
1. Амурский	Более 525	Более 425 до 525 вкл.	До 425 вкл.
2. Тоболь- ский	Более 475	Более 350 до 475 вкл.	До 350 вкл.
3. Башкир- ский	Более 480	Более 380 до 480 вкл.	До 380 вкл.
4. Енисей- ский	Более 400	Более 325 до 400 вкл.	До 325 вкл.
5. Якутский	Более 340	Более 260 до 340 вкл.	До 260 вкл.
6. Забай- кальский	Более 300	Более 225 до 300 вкл.	До 225 вкл.
Шкурки солонгоя			
	Более 250	Более 150 до 250 вкл.	До 150 вкл.

Примечание. Площадь шкурки определяют путем умножения результатов измерений ее от середины междуглазья (по средней линии хребта) до корня хвоста на двойную ширину, измеряемую посередине шкурки.

6. В зависимости от качества волосяного покрова и мездры шкурки колонка и солонгоя делятся на сорта в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

Сорта	Качество волосяного покрова и мездры шкурок	
	колонка	солонгоя
Первый	Полноволосый, развившийся, с высокой частой остью и густым пухом. Мездра без синевы. Хвост пушистый	Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым пухом. Мездра чистая

Продолжение

Сорта	Качество волосяного покрова и мездры шкур	
	колонка	солонгоя
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом. Мездра с легкой синевой по хребту от огузка до половины шкурки. Хвост недостаточно опушен	Полуволосый, с недостаточно развившимися и низкими остью и пухом. Мездра синеватая
Третий	Полуволосый со слабо развившимися и низкими остью и пухом. Мездра синяя. Хвост слабо опушен	—

7. В зависимости от наличия пороков шкурки подразделяют по дефектам на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Пороки	Группы дефектов		
	Малый	Средний	Большой
1. Разрывы общей длиной в процентах к длине шкурки	До 10,0 вкл.	10,1—20,0	20,1—50,0; шкурки, перерваные поперек
2. Дыры и вытертые места в процентах к общей площади шкурки	До 1,0	1,1—2,0	2,1—4,0
3. Пleshины в процентах к общей площади шкурки	Не допускаются	До 1,0	1,1—2,0

Продолжение

Пороки	Группы дефектов		
	Малый	Средний	Большой
4. Прострелы дробовые:			
шкурки колонка	От 2—5	6—8	9—12
шкурки солонгоя	До 3 вкл.	4—5	6—8
5. Признаки линьки	Не допускаются	Ранневесенние с редковатым волосяным покровом на боках или шейной части. Мездра утолщенная, с темной полоской у огузка	—

Примечание. Шкурки с дробовыми прострелами у колонка от 2 до 5, у солонгоя до 3, независимо от их количества на голове до шеи относятся к группе дефектов «малый»; шкурки колонка с прострелами от 6 до 8, а у солонгоя от 4 до 5, независимо от их количества на голове и шее относятся к группе дефектов «средний» при отсутствии пороков на остальной части шкурки.

8. На шкурках, относимых к группе дефектов «малый», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов.

На шкурках, относимых к группе дефектов «средний», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов, или двух пороков на группы дефектов «малый».

На шкурках, относимых к группе дефектов «большой», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов, или двух пороков из группы дефектов «средний», или одного порока группы дефектов «средний» и двух пороков группы дефектов «малый».

9. Шкурки, пороки которых превышают нормы, установленные для группы дефектов «большой», а также прелые, горелые, поврежденные молью оцениваются не более 25% стоимости первого сорта крупного размера.

10. Шкурки колонка и солонгоя весенние и поздневесенние с сильно поредевшим волосяным покровом или выпадающим волосом; летние с низким, грубым волосяным покровом, почти без пуха; раннеосенние с едва начавшими развиваться остью и пухом; шкурки детенышей с пухлявым волосом относятся к нестандартным.

11. Упаковку и маркировку шкурок колонка и солонгоя производят по ГОСТ 12266—66.

ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок в процентах к стоимости шкурок первого сорта крупного размера
(рекомендована Центросоюзом)

Колонок

Размеры шкурок	Сорта											
	Первый				Второй				Третий			
	Нормаль- ные	Группы дефектов			Нормаль- ные	Группы дефектов			Нормаль- ные	Группы дефектов		
		Малый	Средний	Большой		Малый	Средний	Большой		Малый	Средний	Большой
Крупный	100,0	90,0	75,0	50,0	75,0	67,5	56,3	37,5	50,0	45,0	37,5	25,0
Средний	75,0	67,5	56,3	37,5	56,3	50,7	42,2	28,1	37,5	33,8	28,1	18,8
Мелкий	50,0	45,0	37,5	25,0	37,5	33,8	28,1	18,8	25,0	22,5	18,8	12,5

Солонгой

Размер шкурок	Сорта							
	Первый				Второй			
	Нормальные	Группы дефектов			Нормальные	Группы дефектов		
		Малый	Средний	Большой		Малый	Средний	Большой
Крупный	100,0	90,0	75,0	50,0	50,0	45,0	37,5	25,0
Средний	75,0	67,5	56,3	37,5	37,5	33,8	28,1	18,8
Мелкий	50,0	45,0	37,5	25,0	25,0	22,5	18,8	12,5

Скидки в процентах от зачетной стоимости шкурок колонка и солонгой: за нестандартную правку — 10,0; за отсутствие хвоста — 10,0; за отсутствие головы до шеи — 10,0; за отсутствие головы с шеей — 25,0.

РАЗРАБОТАН Центросоюзом

Начальник Главкоопжирсырье **Потапов С. В.**
Исполнитель ст. экономист-товаровед **Лукашов Н. И.**

ВНЕСЕН Центросоюзом

Член правления Центросоюза **Потапов С. В.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ отделом легкой промышленности Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Начальник отдела **Богатов А. В.**
Ст. инженер **Берсенева З. К.**

УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, 4.

Сдано в наб. 22/XII 1966 г. Подп. в печ. 6/I 1967 г. 0,5 п. л. Тир. 10000

Гип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 3035

Изменение № 1 ГОСТ 12419—66 Шкурки колонка и солонгоя невыделанные
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 23.08.88 № 3001

Дата введения 01.02.89

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»
«Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 98 7883.

Пункт 9 изложить в новой редакции: «9. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкурки прелые, го-

(Продолжение изменения к ГОСТ 12419—66)

релые, поврежденные молью, шкурки весенние и поздневесенние с сильно поредившим волосяным покровом или выпадающим волосом, летние с низким, грубым волосяным покровом, почти без пуха, раннеосенние с едва начавшими развиваться остью и пухом, шкурки детенышей с пухлявым волосяным покровом относят к нестандартным».

Пункт 10 исключить.

Приложение. Таблицу дополнить примечанием: «Примечание. Нестандартные шкурки оценивают не более 25 % качества шкурок первого сорта крупного размера группы дефектов «нормальная».

(ИУС № 12 1988 г.)